
Pielonefritis enfisematosa: presentación de un caso y revisión de la literatura

Emphysematous pyelonephritis: case report and literature review

Yilán Lobo- Rodríguez; Melizza García Vidal; Manuel Vidal Elías

Hospital Militar Carlos J. Finlay. la Habana. Cuba

M.Sc. Prof.Inst, Especialista de Primer Grado Urología.

Master en Longevidad Satisfactoria

Correo(s) electrónico(s):

yilan@gmail.com.

Fecha de recepción: 16 de octubre de 2017

Fecha de aceptación: 18 de diciembre de 2017

Resumen

La pielonefritis enfisematosa es una infección necrotizante del parénquima renal y sus áreas circundantes que da como resultado la presencia de gas en el parénquima renal, sistemas colectores o tejido perinefrítico. Afecta especialmente a pacientes diabéticos con mal control de su enfermedad. Esta grave afección conlleva altas tasas de mortalidad aún a pesar del tratamiento agresivo. Lo más importante en el manejo de la misma es un precoz diagnóstico y agresivo tratamiento, casi siempre con nefrectomía. Se presenta un caso clínico típico, haciendo especial énfasis en el diagnóstico clínico y por imagen, así como en el tratamiento, y en su evolución. Asimismo se realiza una revisión de la literatura intentando comprender mejor este proceso, y encontrar bases definidas para su abordaje terapéutico.

Palabras clave: Pielonefritis enfisematosa; Diagnóstico; Tratamiento; Infección necrotizante

Abstract

Emphysematous pyelonephritis is a necrotizing infection of the renal parenchyma and its surrounding areas that results in the presence of gas in the renal parenchyma, collecting systems or per nephritic tissue. It affects especially diabetic patients with poor control of their disease. This serious condition leads to high mortality rates despite aggressive treatment. The most important aspect in its management is a precocious diagnosis and aggressive treatment, almost always resulting in a nephrectomy. A typical clinical case is presented, with special emphasis on clinical and imaging diagnosis, as well as on

treatment and its evolution. Likewise, a review of the literature is made trying to better understand this process, and to find definite bases for its therapeutic approach.

Key Words: Emphysematous Pyelonephritis; Diagnosis; Treatment; necrotizing infection

Introducción

La pielonefritis enfisematosa es una grave afectación aguda y necrotizante del parénquima renal y tejidos perirrenales, causada por uropatógenos gram-negativos que se comportan como anaerobios facultativos en determinadas situaciones de baja concentración de oxígeno, creando una infección y produciendo gas por mecanismos aún no del todo esclarecidos. Es más frecuente en mujeres y diabéticos, asociado o no a obstrucción o factor estásico ureteral. La evolución sin tratamiento, o con tratamiento médico únicamente alcanza tasas de mortalidad del 80%. Esto último hace que el diagnóstico rápido, sospechándolo en un diabético con foco séptico urinario, o no conocido, con empeoramiento de su estado general y escasa respuesta a antibióticos convencionales, sea esencial en aras de un manejo agresivo y precoz que garantice mayores posibilidades de éxito. Los datos clínicos y de laboratorio raramente conducen al diagnóstico, siendo imprescindibles estudios radiológicos.

En este artículo se aporta un caso, más a la escasa casuística existente, que es típico en su desarrollo, evolución y manejo, y que pone de manifiesto la necesidad de la sospecha precoz, los datos radiológicos, y el tratamiento agresivo de entrada.

Desarrollo

Caso clínico.

Paciente femenina de 54 años con antecedentes personales de ser fumador y D. Mellitus (a tratamiento con insulina).

Acude al servicio de urgencias refiriendo que 15 días antes había iniciado un cuadro de disuria que lo llevó a su médico de cabecera, le diagnostica infección urinaria y le indicaron ciclo corto de antibiótico. 7 días después y una vez finalizado el tratamiento vuelve a acudir a su médico por iniciar un dolor en región lumbar izquierda de naturaleza constante y exacerbación con los movimientos, etiquetándose de proceso mecánico y tratado con miorrelajantes.

A los cuatro días de haber iniciado el nuevo tratamiento sufre un empeoramiento progresivo en su estado general acompañado de náuseas y vómitos de contenido alimenticio, con escalofríos, y disuria. Ante lo cual la paciente decide abandonar el tratamiento con insulina.

Finalmente ante la mala evolución (aumento de dolor, somnolencia...) el paciente acude a urgencias. A su llegada se detecta un importante descontrol glucémico.

La exploración física revela: Ta: 37°C. Fc: 100 l.p.m. T.A.:118/80. Se encuentra consciente,somnolienta.

Desde el punto de vista neurológico no se aprecia focalidad, ni signos meníngeos y las pupilas son isocóricas y normorreactivas. La auscultación cardiopulmonar se caracteriza por la presencia de una taquipnea (35 resp/minuto) y roncus aislados en ambos campos. En la región abdominal presenta, un abdomen blando y depresible, no doloroso, no defensa, no datos de peritonismo, RHA +, la puño-percusión es positiva en fosa lumbar izquierda.

Los datos analíticos muestran los siguientes resultados: *Hemograma*: Hto 47%, leucocitos 22000/mm³, plaquetas 183.000. Coagulación: TP 17,10 seg. *Bioquímica*: urea 125 mgr/dl, creatinina 3,5 mgr/dl, k⁺7,6 mEq/l, Na²⁺ 108 MEq/l, glucosa 1430 mgr/dl. Gasometría venosa: PH 6,95, Hco₃-4,3.


En la orina se aprecia: sedimento: 6-8 hematíes/ campo, 20-25 leucos/campo, algunos gérmenes. Na²⁺ en orina 108 Meq/l y K⁺ de 14 MEq/l. Glucosuria y cetonuria:+.

Se enfoca de inicio como un cuadro de cetoacidosis diabética con infección urinaria acompañante con inestabilidad, por lo que se decide paso a UCI antes de completar estudios radiológicos

En la UCI se inicia perfusión endovenosa continua con insulina, reposición hídrica, corrección de la acidosis y de los trastornos electrolíticos, comenzando con tratamiento antibiótico empírico de piperacilina- tazobactam + tobramicina. En la Rx simple de abdomen se aprecia un contorno aéreo delimitando la silueta renal izquierda.

Simultáneamente se practica ecografía abdominal que muestra importantes alteraciones del riñón izquierdo por lo que se decide practicar T.A.C. con resultado de imágenes compatibles con pielonefritis enfisematosa, que destruye de manera importante el parénquima del riñón izquierdo (Figs.1).

T.A.C. abdominal con contraste, en la que podemos observar destrucción parcial de parénquima, que es sustituido por imagen de densidad aire



Se diagnostica el cuadro como pielonefritis enfisematosa en paciente diabético descompensado y se decide embolización del riñón derecho y 48 horas después la nefrectomía derecha por vía anterior

transperitoneal. Observándose la grasa perirrenales edematosa, riñón con parcheado necrótico cortical irregular y cápsula conservada. Se liga pedículo en bloque extrayéndose la pieza. (Figs.2).

Se realizó La embolización del riñón derecho y 48 horas después la nefrectomía derecha por vía.



Anterior.

Tras la cirugía el paciente retorna a la unidad de Cuidados Intensivos precisando de inicio ventilación mecánica no invasiva, en relación con una hipoxemia secundaria a aparición radiológica de infiltrado intersticial, que se interpreta como derivado de su situación de sepsis. Posteriormente mantiene una buena evolución con el devenir de las horas, recuperando su estabilidad hemodinámica y ventilatoria. La producción por drenajes es mínima y sanguinolenta.

Se recibe el resultado de los hemocultivos y del cultivo de muestra tomada durante la intervención, coincidiendo ambos en el crecimiento de un E. Colli sensible a cefalosporinas de 3ª generación, betalactámicos + inhibidores de las betalactamasas, aminoglucósidos, quinolinas y carbapenémicos. Dados los resultados y las concentraciones mínimas inhibitorias, se decide cesar la antibioterapia empírica cambiando a quinolinas (ciprofloxacino). Progresivamente se van recuperando parámetros analíticos de función renal y los trastornos hidroelectrolíticos. Es alta hospitalaria 11 días después de su ingreso tras ajuste de su insulino terapia.

El análisis histológico de la pieza: extensas áreas de infarto hemorrágico; intensa pielonefritis aguda con formación de abscesos que se extienden a grasa perirrenales; trombos de fibrina en vasos.

Discusión: Desde la primera aportación a la literatura de un caso de pielonefritis enfisematosa en 1898 por Kelly y Mac Callum, existen alrededor de 100 publicados en el mundo, lo cual nos da indicios de la escasa incidencia de este cuadro.

Sin embargo teniendo en cuenta la gravedad del mismo, la eventual dificultad diagnóstica si no se sospecha, y la rápida y mortal evolución, nos parece importante recordar ciertos aspectos.

Hay que tener en cuenta que en lo relativo a la epidemiología se trata de un proceso, según se desprende de los datos aportados por las dos series más extensas de la literatura (Shekeir, 1997, Ahlering, 1985), cuya media de edad se sitúa en torno a los 55 años. Es más frecuente en mujeres (aprox. 75%), y aunque puede ocurrir en pacientes no diabéticos, sobre todo asociado a obstrucción ureteral, el 80% los son, siendo aún más frecuente en diabetes mal controladas, con cierto grado de disfunción renal y/o necrosis papilar.

La patogenia está poco definida. Se piensa que a las áreas de micro infarto secundarias a microangiopatía diabética, con bajas tensiones de oxígeno tisular, asociadas a altas concentraciones de glucosa en sangre por descompensaciones diabéticas se le suma la infección activa por uropatógenos habituales, los cuales en ausencia de oxígeno se convierten en anaerobios facultativos.

Éstos utilizan la glucosa como sustrato alimentario, fermentándola y convirtiéndola en dióxido de carbono, produciendo gas, en contra de lo que pudiera parecer la infección no es producida por anaerobios, sino por uropatógenos típicos, Coli (la gran mayoría), Klebsiella, Proteus, y menos frecuente por Pseudomonas. En toda la literatura hay descrito un caso por Cándida. Sólo existe un caso publicado de pielonefritis enfisematosa por anaerobios⁹. A pesar de su conocida propensión a formar gas el Clostridium no ha sido nunca aislado en este tipo de infecciones.

La presentación clínica habitual, es la de una pielonefritis aguda severa que no responde a tratamiento. Casi todos los pacientes presentan la típica triada de fiebre, vómitos y dolor en flanco, asociados en ocasiones a masa en flanco. Este modo de presentación asociado a mal estado general, y descompensación diabética nos debe alertar siempre sobre la posibilidad de este cuadro. Los cultivos son positivos para el patógeno correspondiente.

El diagnóstico raramente se establece por la clínica y los datos de laboratorio (leucocitosis, a veces leucopenia, alargamiento de tiempos de coagulación, y demás signos de infección o sepsis). Es necesaria la realización de pruebas de imagen. En todo diabético que presente fiebre, dolor abdominal, inflamación, en flanco, etc. con lentitud en la respuesta a antibióticos, es mandatorio la realización de una radiografía simple de aparato urinario, para valorar la existencia de gas perinefrítico o intraparenquimatoso. La imagen típica consiste en un halo de aire extra intestinal, en la zona de la silueta renal. Si persisten dudas habrá que realizar una T.A.C. la cual revelará la existencia de aire intraparenquimatoso o perinefrítico. Otros métodos diagnósticos pueden ser la Urografía Intravenosa (U.I.V.) y la Ecografía. La U.I.V. suele mostrar además de los datos de la radiología simple, la anulación del riñón afecto, o la existencia de gas en la vía.

La ecografía es una técnica altamente fiable en numerosas afecciones inflamatorias del riñón y suele ser la primera exploración después de la radiografía simple de abdomen, en el diagnóstico de infección urinaria con dolor abdominal, habiendo autores que la propugnan en el diagnóstico de la pielonefritis enfisematosa.

Sin embargo para otros su eficacia es dudosa debido a la existencia de gas que puede artefactar los hallazgos. En cualquier caso la T.A.C. parece el método de imagen princeps. No sólo diagnostica claramente la existencia de gas intrarrenal sino que evalúa la cantidad de parénquima afectado, sirviendo para conocer la presumible funcionalidad de esa unidad renal, y planificar el eventual tratamiento quirúrgico.

Debido a la amenaza vital que supone este cuadro es fundamental no sólo un rápido y certero diagnóstico, sino también un precoz manejo. El tratamiento debe iniciarse con un estricto control de la diabetes, la instauración de una pauta antibiótica correcta, empírica al inicio, cubriendo gram-negativos, y en espera del cultivo y antibiograma.

La corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, así como el mantenimiento de las constantes exigen el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. Dado que la mortalidad estimada para aquellos casos tratados médicamente es del 80%, mientras que en los casos en los que se realiza tratamiento quirúrgico es del 30%, la actitud agresiva es una máxima en el tratamiento de esta patología. La mayoría de los autores proclaman la nefrectomía de urgencia como base del tratamiento quirúrgico. En ocasiones se ha planteado la posibilidad de colocación de una nefrectomía percutánea para derivar el contenido infeccioso y conseguir preservar esa unidad renal. Nosotros pensamos que dada la gravedad del cuadro, y el hecho de que generalmente la destrucción del parénquima es masiva o submasiva y en cualquier caso existe casi siempre una microangiopatía de base, que hace que raramente ese riñón sea recuperable. Por otra parte el pus es demasiado viscoso para drenar por un catéter percutáneo además de que la naturaleza multiloculada de estas infecciones hace que sea difícil su completa evacuación. La única justificación para utilizar este procedimiento conservador sería la existencia de una pielonefritis bilateral (10% de los casos), y el que sea un paciente monorreno. La preservación del parénquima renal es un importante objetivo que puede salvar la vida de estos pacientes.

Conclusiones

A modo de conclusión podemos afirmar que el caso que presentamos reúne todas las características de un típico caso de pielonefritis enfisematosa. Lo único que no es típico es el sexo ya que es más frecuente en mujeres. El resto está en consonancia con toda la bibliografía revisada. Desde el modo de presentación, en un diabético mal controlado, con clínica característica, hasta los hallazgos

radiológicos, la evolución, y el tratamiento instaurado. Para finalizar, nos parece de suma importancia recordar que: el diagnóstico tiene que ser sospechado, adelantándonos a los acontecimientos, el tratamiento con medidas de soporte en una unidad de Cuidados Intensivos y la antibioterapia agresiva son pilares fundamentales del diagnóstico, y que sobre todo el tratamiento quirúrgico agresivo con nefrectomía mejora ostensiblemente el pronóstico consiguiendo la supervivencia de los enfermos como es el caso del paciente expuesto en este artículo.

Referencias Bibliográficas

- AB, Vaughan ED, Wein AS. Eighteen. (2002). Edition. Philadelphia. *Saunders Company*.
- Bonsoms N, Mancebo J, Blanch L. (1992). *Pielonefritis enfisematosa: aportación de un caso y revisión de la literatura*. *Rev Clin ESP*. 190: 72-74.
- Eloubeidi MA, Fowler VG Jr. (1919). *Images in clinical medicine. Emphysematous pyelonephritis* *Engl J Med* 1999; 341:737.
- Hudson MA, Weyman PJ. (1986). *Emphysematous pyelonephritis: successful management by percutaneous drainage* *Urol* 1986; 136:884-886.
- Johnson JR, Ireton RC, Lipsky BA. (1986). *Emphysematous pyelonephritis caused by Candida Albicans*. *J Urol*; 136: 80-82.
- Kelly H, Mac Callum WG. (1893). *Pneumaturia*. *JAMA*; 31: 375.
- Lowe Ba, Poage Md. (1991). *Bilateral emphysematous pyelonephritis*. *Urology*; 37: 229-232.
- Monllor Gisbert J, Galbis Palau F. (1995). *Pielonefritis enfisematosa*. *Arch Esp Urol*; 48: 956-959.
- Ribot T, Bonsoms N, Prera A. (1992). *Pielonefritis enfisematosa: una enfermedad que precisa un alto índice de sospecha para su diagnóstico precoz*. *Rev Clin ESP*; 191:399.
- Shahatto n, AL Awadhi nz, Ghazali S. (1990). *Emphysematous pyelonephritis: surgical implications*. *Br J Urol*; 6: 572-574.